

נספח חיסונים - שלוחת ההטלה

גיל	הערה	סוג התרכיב	שיטת החיסון (בהעדר אזכור יש לפעול ע"פ הוראות היצרן)
יום בקיעה		ניוקסל חי ¹ + ברונכיטיס מדבקת חי	ריסוס / ערפול
		מארק ביוולנטי (SB1+HVT) או ריספנס	הזרקה
	#	סלמונלה חי (אנטריטידיס) ²	מי שתיה ראשונים/ריסוס
10 - 14 יום		ניוקסל מומת	הזרקה
		קוקסידיוסיס	ריסוס
		אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה
		ברונכיטיס מדבקת חי	מי שתיה או ריסוס
		אבעבועות	דקירה או הזרקה
10 - 21 יום		גמבורו מומת	הזרקה
	\$	או גמבורו חי	מי שתיה
4 שבועות		ניוקסל חי	ערפול
		ברונכיטיס מדבקת חי	ערפול
5 - 7 שבועות	#	סלמונלה חי (אנטריטידיס)	מי שתיה
		אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה
7 - 9 שבועות		נזלת מדבקת מומת	הזרקה
8 - 12 שבועות		אבעבועות	דקירה
9 - 13 שבועות		לרינגוטרכאיטיס	מריחה בביב
10 - 11 שבועות		ניוקסל חי	ערפול
		דלקת מח נגיפית (תרנגולות)	מי שתיה + 2% הזלפה לפה
12 שבועות		ניוקסל מומת	הזרקה
		ברונכיטיס מדבקת מומת	הזרקה
		נזלת מדבקת מומת	הזרקה
	#	סלמונלה חי (אנטריטידיס) או מומת (טיפימוריום + אנטריטידיס) ³	מי שתיה הזרקה
		אינפלואנזה מומת (H9N2)	הזרקה
14 - 16 שבועות לא יאחר מ-7 ימים טרם ההוצאת פרגיות		ניוקסל מומת	הזרקה
במשך כל תקופת ההטלה - פעם בחודשיים		ניוקסל חי	ערפול

בהתאם להוראות היצרן אין לטפל בתכשירים בעלי פעילות אנטי חיידקית בטווח זמן של 3 ימים לפני ואחרי מתן החיסון. במידה והלהקה טופלה יש לחזור על החיסון 3 ימים תום הטיפול.

* או באמצעות תערובת לאורך חיי הלהקה, יש להפריד מתן התרכיב ממתן תרופות אנטי קוקסידיה.

\$ גמבורו חי יש להפריד 3 ימים מחיסונים חיים אחרים.

בלהקות יבוא:

(1) יש לבצע את החיסון מיד עם הגעת הלהקה למשק.

(2) החיסון הראשון לא לפני גיל 21 יום.

(3) תרכיב מומת רק לאחר שחרור הלהקה מהסגר יבוא.

ניתן לחסן בתרכיב חי בטרם השחרור.

- יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות.
 - חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף.
 - חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
 - חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה.
 - אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
 - החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד - 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי מערך בריאות העוף בלבד.